

NOVA TECNOLOGIA COSMÉTICA PARA TRATAMENTO E REDUÇÃO DA GORDURA ABDOMINAL MASCULINA

- Previne a deposição de gordura na área abdominal;
- Reduz significativamente o diâmetro da cintura.

A vaidade masculina vem ganhando forças nas últimas décadas. Mais à vontade para mostrar seu desejo de tornar-se atraente, o homem foi estimulado pelas novas exigências do mercado. Hoje, no universo profissional existe uma cobrança maior pela boa apresentação. O homem moderno sabe que uma aparência saudável e magra é sinônimo de arrojo e elegância.

Vários cosméticos podem ser encontrados para o público feminino. No entanto, existem poucos para o público masculino, muito menos desenvolvidos para sua fisiologia específica.

A Loção Criogênica

É uma combinação vetorizada de flavonóides da Laranja Amarga, extrato rico em hesperidina, e extrato de guaraná, rico em cafeína. Este produto único, específico para homens com mais de 30 anos, previne e reduz a deposição de gordura na área abdominal. Devido a sua exclusiva tecnologia de vetorização, **Abdoliace** é capaz de penetrar nas camadas mais profundas da pele, atingindo diretamente os adipócitos onde toda a gordura é armazenada.

Mecanismo de ação

A lipólise pode ser ativada de duas maneiras: ou por estímulo dos receptores B-adrenérgicos ou pela diminuição do afeito inibidor da fosfodiesterase. Nos dois casos, a adenilato ciclase é ativada, aumentando a concentração de AMPc, resultando no estímulo da LHS (Lípase Hormônio Sensível), responsável pela lipólise dos triglicerídeos. No caso dos homens, a LHS também pode ser ativada pela testosterona. Porém, sabe-se que ocorre o decréscimo natural de testosterona após os 30 anos e, que este hormônio passa a sofrer a ação da aromatase, que diminui ainda mais sua disponibilidade para a célula adiposa. Sendo assim, a aromatase também interfere no processo da lipólise.

A Loção age de três maneiras complementares, sinérgicas e específicas:

1 – Atinge diretamente os adipócitos

Spherulites®, é uma tecnologia moderna de encapsulação. São compostas por microvesículas concêntricas contendo em seu interior princípios ativos. Quando vetorizadas, as moléculas ativas penetram na epiderme e são diretamente orientadas para os adipócitos.



Dra. Rosa Moassab
Centro Ortomolecular Integrado Vita Naturalis

Rua André Puento, 78 - Bairro Independência - Porto Alegre / RS
<http://www.vitanaturalis.com.br>

Este processo resulta em maior eficácia do ativo.

2 – Previne o acúmulo de triglicerídeos nos adipócitos

O extrato da Laranja Amarga (*Citrus Arantium*) contém 95% de hesperidina. A hesperidina inibe a Aromatase, que é a enzima responsável pela conversão de testosterona em estradiol. Assim, o extrato da Laranja Amarga limita a diminuição da taxa de testosterona nas camadas mais profundas da pele, nos homens com mais de 30 anos.

3 – Queima e degrada os triglicerídeos nos adipócitos

O extrato de guaraná (*Paullinia cupana*) é muito conhecido por suas propriedades termogênicas. A cafeína, presente no extrato de guaraná, age tanto sobre os receptores B-adrenérgicos, estimulando a adenilato ciclase e, por consequência a lipólise, quanto sobre a fosfodiesterase, diminuindo sua ação inibitória, permitindo assim, a que LHS possa degradar os triglicerídeos.

Testes de eficácia

Redução do diâmetro da cintura - (*teste in vivo*)

o teste foi realizado com 14 homens, com idades entre 28 e 60 anos, (média de 41 anos de idade) e índice de massa corpórea de 27,7. os voluntários aplicaram um gel contendo 3% do produto, uma vez ao dia, durante 28 dias, na área abdominal e lateral com gordura localizada “pneuzinhos”. A aplicação foi realizada sem massagem, pois o produto possui alta capacidade de penetração.

Resultados:

- Após 7 dias houve uma perda média de 0,6 cm no diâmetro da cintura;
- Após 14 dias, a perda média foi de 1,2 cm;
- Após 28 dias a perda média foi de 1,9 cm.

Em 28 dias, em um dos voluntários, o produto reduziu o diâmetro da cintura em até 4,5 cm e reduziu o diâmetro da cintura em 86% dos voluntários.

O Gel reduziu significativamente a gordura da área abdominal e lateral “pneuzinhos”. Exames de ultrassom revelam que ocorreu uma redução na espessura da hipoderme na área abdominal de 3,8% e na área lateral “pneuzinhos” de 11,7%.

Indicações:

É indicado para homens, a partir dos 30 anos, com gordura localizada na área abdominal e lateral “pneuzinhos”.



Dra. Rosa Moassab
Centro Ortomolecular Integrado Vita Naturalis

Rua André Puento, 78 - Bairro Independência - Porto Alegre / RS
<http://www.vitanaturalis.com.br>